

速乾性アルコールジェル

プチクール[®]ジェル80

◆ 手指消毒方法 ◆

※
手が汚れている時は、まず石けんでよく洗浄してください。



①
本品を適量、手のひらに取ります。



②
手のひら、手の甲、爪、手首、手指にすりこみ、乾燥するまで全体になじませます。



販 売 名	アルコールジェルIM-A				
成 分	有効成分：エタノール(C ₂ H ₆ O) 76.9~81.4vol% 添 加 物：ヒアルロン酸Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン				
用 法 ・ 用 量	適量を手のひらに取り、手指全体に伸ばし、乾燥するまでよく擦り込む。				
効 能 ・ 効 果	手指・皮膚の洗浄・消毒				
使用上の注意	<p>してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●次の人は使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 1. 患部が広範囲な人。 2. 深い傷やひどいやけどの人。 <p>相談すること</p> <ul style="list-style-type: none"> ●次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ●次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること 使用後、次の症状があらわれた場合 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>関係部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
	関係部位	症状			
皮膚	発疹・発赤、かゆみ				
用法・用量に関する注意	<ul style="list-style-type: none"> ●用法・用量を厳守すること。 ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 ●目に入らないように注意し、万一入った時はすぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。 なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。 ●外用にのみ使用すること。 ●手が汚れている場合、石けんでよく洗浄後、使用すること。 ●使用後は手を十分に乾燥すること。 				
保管及び取扱い上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●火気を避け、直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。 ●小児の手の届かない所に保管すること。 ●他の容器に入れ替えないこと。 ●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。 ●床、家具、メガネ等の塗装面に付着しないようにすること。 				
規格・荷姿	500mL				

火気厳禁 アルコール類(エタノール)/水溶性/危険等級(Ⅱ)

代理店

佐藤歯材株式会社

〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目15番3号
TEL(03)3833-3986(代) FAX(03)3833-3989

発売元



乾商事株式会社

本 社 〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目1番7号
TEL(06)6788-0020(代) FAX(06)6788-0025

製造販売元



株式会社イヌイメディックス

本 社 〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目1番7号
開発研究所 TEL(072)967-1315(代) FAX(072)967-2607

